

Locaties

Hooglanderveen Fit2Move | Disselplein 4 | 3829 MD Hooglanderveen

Zielhorst Gezondheidscentrum Zielhorst | Trombonestraat 123 | 3822 CW Amersfoort

Kattenbroek Gezondheidscentrum Kattenbroek | De Herfststraat 15 | 3823 CS Amersfoort

Vathorst Medisch centrum Vathorst | Wervershoofstraat 363 | 3826 EM Amersfoort

Fyzie Zuid Cartesiusstraat 2 | 3817 XP Amersfoort | 033 461 42 74

fyzie
Fysiotherapie
Amersfoort

033 204 80 00
info@fyzie.nl

Openingstijden

De tijden zijn per locatie wisselend.

Maandag van 07.30 tot 21.00 uur
Dinsdag van 08.00 tot 21.00 uur
Woensdag van 07.30 tot 21.00 uur
Donderdag van 08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur
Zaterdag* van 09.00 tot 12.00 uur

fyzie.nl

* Uitsluitend voor groepstrainingen op locatie Vathorst



fyzie
Fysiotherapie
Amersfoort

Lymfoedeem en Kanker

fyzie.nl



Lymfoedeem kan ontstaan door kanker en de bijbehorende behandeling. Door de groei van de tumor in de lymfeklieren, door een behandeling (operatie, chemotherapie en/of bestraling) en door uitzaaiingen.

Behandeling bij kanker

Een operatie of bestraling kunnen elk apart lymfoedeem veroorzaken, een gecombineerde behandeling vergroot zelfs die kans.

Er is een risico om lymfoedeem te ontwikkelen na een behandeling van de volgende vormen van kanker: borstkanker, baarmoederhalskanker, darmkanker, lymfeklierkanker (Hodgkin- en Non-Hodgkin-lymfoom), kanker in het hoofd-halsgebied, melanoom, prostaat­kanker, peniskanker of schaamlipofwel vulvakanker.

Groei/ Uitzaaiingen

Groei en uitzaaiingen van kanker kan het lymfestelsel beschadigen of “verstopen”.

Een andere oorzaak van lymfoedeem kan een aangeboren slecht functionerend lymfestelsel zijn. Als hierbij een behandeling van kanker wordt toepast en het lymfestelsel wordt beschadigd, leidt dat vaak tot verergering van het bestaande

lymfoedeem of het ontstaan van nieuwe klachten. Het is daarom altijd belangrijk om de oorzaak van lymfoedeem te onderzoeken. Hoe eerder maatregelen worden genomen, des te groter de kansen zijn op vermindering van lymfoedeem.

Doel

Door manuele lymfedrainage toe te passen, eventueel gecombineerd met andere behandelmogelijkheden (zoals lymfetaping, compressie­therapie, therapeutische elastische kousen en oefentherapie) worden uw klachten verminderd. Samen zorgen wij ervoor dat uw klachten verminderen en het oedeem in balans komt.

Meer informatie

www.nvfl.nl / www.fyzie.nl
Of mail naar Marije van Logtenstein
mvanlogtenstein@fyzie.nl.